

11) **Porella revoluta** (Lehm.) Trev. var. **propinqua** (Mass.) Hatt.

Ningshen Co., Ho-dih-tang, 1800 m, July 1962, P.C. Chen 200. Tai-pai-shan, Hau-ping-sze, Ti-tsu-kou, 1350 m, July 1963, C.P. Wei 4878 & 4890 (soil-covered rocks); —, Dah-tien, Si-kou, 2200 m, July 1963, C.P. Wei 5232 (soil-covered rock); Taipei Co., S slope of Chinling range, Shiao-hau-dih, 1500 m, Aug. 1963, C.P. Wei 5907 & 5915a (rock-cliff).

Distr.: China (Shensi). [Var. *revoluta* is distributed in India, Nepal, Sikkim, Bhutan, and China (Yunnan and Shensi).]

12) **Porella stephaniana** (Mass.) Hatt.

Hua-shan, Aug. 1962, P.C. Chen 849 (exposed rock-cliff). Tai-pai-shan, Hau-ping-sze, Houh-kou-koou, 1200 m, forest edge, July 1963, C.P. Wei 4957 (rock-cliff); S slope of W Tai-pai-shan, Hwang-bai-yuan, La-da-shih, Sept. 1963, C.P. Wei 6591 (rock-cliff). Tai-pai Co., S slope of Chinling range, Shiao-hau-dih, 1500 m, Aug. 1963, C.P. Wei 5892, 5901b, 5935a (rock-cliffs).

Distr.: China (Shensi, Chekiang); Japan.

## Reference

Hattori, S. 1978. Studies of the Asiatic species of the genus *Porella* (Hepaticae). VII. A synopsis of Asiatic Porellaceae. J. Hattori Bot. Lab. 44: 91-120.

\* \* \* \*

中国陝西省から雲南省一帯はクラマゴケモドキ科苔類が多く、興味深い種のある点でも一番と思われる。この報告は陝西省産の 2 属 12 種を含むが、更に調査が進めば新しく追加される種も少なくないと考えられる。このうち 1 属 8 種は日本にも産し、日本が同地域の周辺フロラであることは明かである。

□ Düll, R.: **Exkursions Taschenbuch der Moose** 273pp. 1985. IDH-Verlag, Rheurdt. DM 25. ヨーロッパ中部の蘚苔類についてのフィールド・ガイドブックである。様々な生育環境（樹幹、石灰岩、地上等）にどんな種類がみられるか、どのようにして蘚苔類を調べるか、属や種類の検索、検索された 142 種類についての解説及び各種の重要な区別点を示す図などから構成されている。日本にも普通にみられる種が多く、参考になる。 (井上 浩)